

自然薯の主要病害虫防除基準

政田自然農園2011/2/1更新

薬 剤 名	ムカゴ 適用	1 年 生 雑 草	青 か び 病	炭 疽 病	つ る 枯 病	褐 色 腐 敗 病	根 腐 病	葉 渋 病	ア ブ ラ ム シ 類	ヨ ト ウ ム シ 類	ヤ マ ノ イ モ コ ガ	ナ ガ イ モ コ ガ	コ ガ ネ ム シ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	ハ ダ ニ 類	カ ン ザ ワ ハ ダ ニ	ネ コ ブ セ ン チ ユ	使用倍率・使用量	使用方法	農薬安全使用基準	
																				使用時期 (収穫前日数)	使用回数
植付前処理剤	ネマトリンエース粒剤																	20kg/10a	全面土壌混和	植付前	1回
	アドマイヤー1粒剤																	4kg/10a	植溝土壌混和	植付時	1回
	クロルピクリン錠剤																	1穴当り1錠	30×30cm毎に1錠	植付17日前	1回
	ガスタード微粒剤 (バスアミド微粒剤)																	20～30kg/10a	所定量を均一に散布して 土壌混和	植付21日前	1回
	ベンレートT水和剤20																	100倍～200倍	10分間種芋浸漬	植付前	1回
	ベルコートフロアブル																	200倍	10分間種芋浸漬	植付前	1回
	ティーピック水和剤																	50倍	約2秒間種芋浸漬	植付前	1回
	ベンレートT水和剤20																	20倍	約2秒間種芋浸漬	植付前	1回
殺菌剤	トップジンM水和剤																	800倍	散布	7日	5回
	ジマンダイセン水和剤																	400倍～600倍	散布	21日	4回
	ダコニール1000																	1000倍	散布	30日	6回
	ラピライト水和剤																	400倍	散布	14日	4回
	ベルコートフロアブル																	1000倍	散布	7日	5回
	キノドー水和剤40																	600倍	散布	14日	5回
	ストロビーフロアブル																	2000倍	散布	7日	3回
	コサイドDF																	1000倍	散布		
	フロンサイド水和剤																	2000倍	散布	14日	4回
	ベルコート水和剤																	1000倍～2000倍	散布	7日	5回
殺虫剤	トレボン乳剤																	1000倍	散布	14日	3回
	モスピラン水溶剤																	4000倍	散布	7日	3回
	DDVP乳剤50																	1000倍～2000倍	散布	14日	6回
	ニッソランV乳剤																	1000倍～1500倍	散布	7日	2回
	マブリック水和剤20																	2000倍～4000倍	散布	7日	2回
	アディオン乳剤																	2000倍～3000倍	散布	7日	5回
	コテツフロアブル																	2000倍	散布	3日	2回
	マイトコーネフロアブル																	1000倍	散布	3日	1回
	コロマイト乳剤																	1000倍	散布	7日	2回
	アタプロン乳剤																	2000倍	散布	3日	3回
	アディオン乳剤																	2000倍～3000倍	散布	7日	5回
トレボン粉剤DL																	4kg/10a	散布	14日	3回	